

ברוקינזה (זנוברוטניב)

אינדיקציות, סטטוס רישום והכללה בסל/קופות החולים

סטטוס רישום/הכללה בסל			התוויה
סל קופת החולים	סל הבריאות	משרד הבריאות	
מכבי, מאוחדת ולאומית קו טיפול ראשון/שני		✓	Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)
	קו טיפול שני ואילך	✓	Mantle Cell Lymphoma (MCL)
	קו טיפול שני ואילך	✓	Waldenstrom Macroglobulinemia (WM)
מאוחדת ולאומית קו טיפול שני ואילך		✓	Marginal Zone Lymphoma (MZL)

ברוקינזה - אופן מתן ומינון

ניתן ליטול ברוקינזה פעם או פעמיים ביום על פי המלצת הרופא.ה המטפלת.

פעם ביום

320 mg

מינון יומי



ארבע קפסולות של 80 מ"ג פעם ביום

או

פעמיים ביום

320 mg

מינון יומי


+


שתי קפסולות של 80 מ"ג בערב
שתי קפסולות של 80 מ"ג בבוקר

שירות חדש: ברוקינזה עד הבית, הכולל:

- ✓ אספקה הישר לבית המטופלת.
- ✓ אספקת התרופה בזמן וללא עיכובים
- ✓ תמיכה בבירוקרטיה מול בית המרקחת
- ✓ ללא צורך בהמתנה בבית המרקחת



ברוקינזה עד הבית

שירות ברוקינזה עד הבית הינו ללא עלות וניתן לכל אורך הטיפול בברוקינזה. להפניית מטופלים.ות לקבלת השירות בטל': 08-6604455

BRUKINSA is indicated for the treatment of adult patients with mantle cell lymphoma (MCL) who have received at least one prior therapy. BRUKINSA is indicated for the treatment of adult patients with Waldenström's macroglobulinaemia (WM). BRUKINSA is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory marginal zone lymphoma (MZL) who have received at least one anti-CD20-based regimen. BRUKINSA is indicated for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) or small lymphocytic lymphoma (SLL).

For full details please refer to the Israeli PI as approved by the MoH.